



Croce Rossa Italiana
Comitato di Treviglio e Geradadda

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Cosa fare in caso di occlusione totale



In caso di occlusione totale, il bambino o l'adulto interessato non è in grado di respirare, emettere suoni e generalmente si porta le mani alla gola.



Chiama il 112, è una situazione di emergenza.





Posizionati alle spalle della persona, passando il braccio sotto la sua ascella, afferra con la mano la mandibola, facendo attenzione a non toccare la gola.



Con la mano libera, dai 5 pacche interscapolari, avendo cura di avere una via di fuga per la mano, dunque prestando attenzione a non colpire la testa.



Alterna alle 5 pacche interscapolari, 5 compressioni dell'addome secondo la manovra di Heimlich. Prosegui fino a quando la persona non riprende a respirare o perde coscienza (in questo caso inizia le compressioni toraciche esterne, come per l'arresto cardiaco)





Croce Rossa Italiana
Comitato di Treviglio e Geradadda

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Cosa fare un caso di occlusione totale nel lattante



L'occlusione totale nel lattante porta necessariamente all'ausilio delle compressioni toraciche. Quando il lattante ha le vie aeree occluse, non piange né emette suoni.



È necessario attivare nell'immediato il sistema di emergenza (112).



Posizionare il bebè sul proprio avambraccio (facendo attenzione di avere appoggiato lo stesso alla coscia) con la testa posizionata più in basso rispetto al bacino. Procedere quindi con 5 pacche interscapolari.



Alternare le 5 pacche interscapolari con 5 compressioni effettuate con 2 dita al centro del torace. Continuare ad alternare queste manovre fino all'espulsione del corpo estraneo o all'arrivo del soccorso qualificato.

Informarsi e formarsi è importante, contattaci per partecipare a un corso
mail: formazione@critreviglio.it
telefono: 036341380

