

| | | | |
|--|--|----------------|--------|
| Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Bergamo Ovest | INDICAZIONI DOSAGGIO CORTISOLO SALIVARE | Tab11POSMeL05 | Rev. 0 |
| | | Data: 15-06-18 | |
| | | pag 1 | di 1 |

ASST BERGAMO OVEST
 Servizio Medicina di Laboratorio
CENTRO PRELIEVI TREVIGLIO
 Tel. 0363 424358/538
CENTRO PRELIEVI ROMANO
 Tel. 0363 990308/990329

Materiale per la raccolta:

- Provetta (SALIVETTE) con tampone di ovatta per raccolta campione

Preparazione:

- Evitare l'assunzione di cibo, o fumo nelle 2 ore precedenti la raccolta del campione
- Sciacquare la bocca con un bicchiere di acqua 5-10 minuti prima della raccolta

Modalità di raccolta:

- Rimuovere il tampone dall'inserito superiore della provetta "salivette" e masticare delicatamente per circa 2 minuti, così da saturarlo di saliva.
- Riporre il tampone nell'inserito superiore, tappare la provetta e consegnare il campione al Centro Prelievi.

Se il campione non viene consegnato subito conservarlo in frigorifero (stabilità: 5 giorni a 2-8 °C)

Il test non è attendibile in presenza di sanguinamento orale.